

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ им. М.М.АДЫШЕВА**

Диссертационный совет Д 03.24.693

На правах рукописи
УДК: 551.482:631.117(575.2) (043)

ТОТУБАЕВА НУРЗАТ ЭРМЕКОВНА

**ВОДНЫЕ И ПОЧВЕННЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРА КЫРГЫЗСТАНА**

03.02.08-экология

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора биологических наук

Бишкек – 2025

Работа выполнена в лаборатории Инженерной и экологической геологии
Института геологии им.М.И.Адышева НАН КР

Научные консультанты: **Кожобаев Канатбек Асекович**, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики

Шалпыков Кайыркул Тункатарович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, директор Института химии и фитотехнологий НАН КР

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Защита диссертации состоится ____ ____ 202__ года в ____ часов на заседании диссертационного совета Д 03.24.693 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора биологических наук при Институте биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики и Исык-Кульском государственном университете им. К. Тыныстанова по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265.

Ссылка доступа трансляции защиты диссертации:

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (г. Бишкек, пр. Чуй, 265а), в библиотеке Исык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова (г. Каракол, ул. Тыныстанова, 26), сайте Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики: <https://vak.kg/>

Автореферат разослан ____ ____ 202__ года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор биологических наук

Бавланкулова К.Д.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Сохранение естественных экосистем и поддержание качества окружающей среды составляют важную часть национальной безопасности и закреплены в ряде ключевых стратегических документов страны. Государственная политика в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов основывается на принципах устойчивого развития, включая равное внимание к экономическим, социальным и экологическим аспектам.

Благодаря своим уникальным природным системам Кыргызская Республика входит в число 200 приоритетных экологических регионов мира, что способствует развитию экологического туризма наряду с индустриальным прогрессом. Однако высокая антропогенная нагрузка на окружающую среду и уязвимость уникальных экосистем создают серьезные угрозы экологической безопасности страны. По данным Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года (2021), естественные ландшафты подвергаются интенсивным преобразованиям, высокогорные пастбища деградируют, почвы эродированы, ухудшается качество водных ресурсов.

Несмотря на наличие множества научных исследований, посвященных загрязнению различных природных компонентов и их возможным последствиям, имеется необходимость в разработке интегрированной оценки экологических критериев состояния водных и почвенных экосистем [Тарасова Н.П., Кручина Е.Б., 2004]. Важно дополнить существующие методы оценки, основанные на парадигме предельно допустимых концентраций (ПДК), а также найти информативные индикаторы, отражающие экологическое состояние этих экосистем и разработать концептуальные методы устойчивого управления природными ресурсами. По определению М.Рожкова: “Человечество переживает переломный момент в процессе перехода к устойчивому развитию. Одним из важных задач является определение и оценка достигнутого прогресса или регресса, степени их развития на пути к устойчивому развитию для осуществления надлежащего контроля за достижениями и управления этим процессом” [М. Рожков, 2015].

Следовательно, разработка оценочных критериев и методик интегрированных показателей состояния почвенных и водных экосистем в рамках конкретных объектов и территориальных границ становится не только необходимой, но и актуальной задачей, позволяющей более точно и всесторонне оценивать состояние экосистем, выявлять уязвимые участки и разрабатывать меры по их восстановлению и сохранению. Создание таких критериев также будет способствовать улучшению мониторинга экологической

ситуации, что, в свою очередь, поможет в принятии обоснованных управленческих решений и обеспечении устойчивого использования природных ресурсов. Учитывая современные вызовы, такие как изменение климата и усиление антропогенной нагрузки, важно интегрировать междисциплинарные подходы и учитывать социально-экономические факторы для более эффективного управления экосистемами.

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, крупными научными программами (проектами), основными научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями. Тема диссертации соответствует перечню критических технологий по приоритетным направлениям развития науки в Кыргызской Республике (ППКР №511 от 13.08.2003г.). Работа выполнена в рамках выполнения задач национальной стратегии по устойчивому развитию, для осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030года; Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы (УП№221 от 31.10.2018г); Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года (ППКР № 435 от 12.10.2021г), в соответствии с планом НИР Кыргызско-Турецкого университета “Манас”, Дирекции Биосферной территории “Ысык-Куль”, а также в рамках выполнения мини проектов ЗАО “Кумтор” Голд Компани, проекта ОФ “Инон” “Үч чака”.

Цель исследования. Разработать критерии и интегрированную методологию оценки экологического состояния почвенных и водных экосистем в промышленных и урбанизированных районах севера Кыргызстана, а также обоснование и внедрение экологически устойчивых технологий направленных на защиту водных и почвенных ресурсов.

Задачи исследования:

1. Разработать научно-практические основы применения многокритериальных экологических индексов для комплексной оценки почвенных экосистем, подверженных загрязнению и аккумуляции тяжелыми металлами;
2. Изучить потенциал использования фитотолерантных растений для фитотестирования нефтезагрязненных почв, для оценки степени загрязнения и эффективности природных методов восстановления почв;
3. Изучить и подобрать индикаторные виды для оценки рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы озера Иссык-Куль;
4. Оценить экологическое состояние озера Иссык-Куль, с применением экологических индексов и критериев;

5. Изучить и обосновать критерии определения ширины прибрежной буферной зоны водных экосистем на примере озера Иссык-Куль.
6. Разработать интегрированные показатели для оценки антропогенной трансформации природных экосистем и степени их экологической нагрузки;
7. Разработать современные модели экологического мониторинга природных экосистем для эффективного управления рисками загрязнения водных и почвенных ресурсов.
8. Разработать экологически устойчивые технологии ремедиации почв промышленных объектов.

Научная новизна полученных результатов:

1. Впервые проведена оценка экологического состояния урбанизированных и техногенных зон (на примере почв Прииссыкуля, Ак-Тюзского рудника), с использованием индексов коэффициента насыщения, геоаккумуляции, коэффициента загрязнения, степени загрязнения, загрязняющей нагрузки, потенциального экологического риска и комплексного риска с использованием подхода ТРИАД и составлены карты пространственного распределения тяжелых металлов в почвах Прииссыкуля;
2. Впервые разработаны и рекомендованы методы фитотестирования для оценки состояния почв, загрязнённых нефтепродуктами, подобраны как устойчивые, так и чувствительные фитотесты и фитотолерантные растения, подходящие для фиторекультивации загрязнённых нефтепродуктами супесчаных почв в г. Балыкчи;
3. Впервые изучены фитоиндикационные параметры облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides* L.), основанные на морфологических изменениях, на росте и развитии растения, в контексте оценки рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы озера Иссык-Куль;
4. Впервые проведена оценка трофического состояния воды озера Иссык-Куль, определена степень трансформации ее прибрежных буферных зон и обусловленные с ними экологические риски (рационализаторские предложения);
5. Впервые определена степень экологической напряженности и оценена уязвимость прибрежных экосистем озера Иссык-Куль, с использованием интегрированного индекса уязвимости прибрежных зон и созданы их оценочно-прогнозные картографические модели;
6. Впервые разработана современная модель экологического мониторинга экосистемы озера Иссык-Куль позволяющая оценивать степень загрязнения, своевременно выявлять угрозы и разрабатывать стратегии по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду (авторское свидетельство);

7. Впервые в условиях высокогорных территорий рудника Кумтор, разработаны экологически устойчивые технологии ремедиации нефтезагрязненных почв, позволяющие не только эффективно очищать почвы, но и сокращать объём отходов, сбрасываемых на полигоны, а также метод повторного использования ТБО, путем получения компоста, решая вопросы устойчивого использования и сохранения почвенных ресурсов;

8. Впервые в условиях высокогорных территорий рудника Кумтор, разработаны и обоснованы подходы к применению местных видов высокогорных растений, обладающих потенциалом для фиторемедиации нефтезагрязненных почв на завершающей стадии ремедиации и рекультивации.

Достоверность и новизна научных результатов подтверждается теоретическими и экспериментальными исследованиями.

Практическая значимость полученных результатов. Разработана система интегрированных показателей качества водных и почвенных экосистем, позволяющая государственным и муниципальным служащим, принимающим решения, анализировать результаты деятельности в области охраны окружающей среды. Эти результаты достигаются путем определения ключевых индикаторов устойчивого развития.

Предложены рационализаторские предложения по оптимизации системы экологического мониторинга озера Иссык-Куль, путем дополнения его параметром "хлорофилла-а" и индекса трофического уровня (TLI) (свидетельство на рационализаторское предложение №991, заявка №2024044.РП). С учетом требуемых изменений в государственную экологическую программу мониторинга была разработана и внедрена научная разработка "Информационная система экологического мониторинга озера Иссык-Куль" (авторское свидетельство на программу для ЭВМ № 969, заявка №20250004.6; акты внедрения от 13.08.2024; 20.08.2024г.), и способ определения ширины прибрежной буферной зоны озера Иссык-Куль (свидетельство на рационализаторское предложение №990, заявка №2024043.РП).

Разработаны рекомендации и руководство по рекультивации нефтезагрязненного грунта полигона опасных отходов ЗАО "Кумтор" Голд Компани. Рекомендуются использовать очищенный грунт при послойной засыпке в качестве изолирующего и рекультивационного слоя полигона рудника (акт выполненных работ от 24.12.2019, С-6123 от 13.11.2018). Полученные данные аналитических и экспериментальных исследований, а также разработанные научные материалы и руководства включены в лекционные курсы и методические указания к лабораторным и практическим

работам для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экологическая инженерия".

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Интегральные показатели качества почв в промышленных и техногенных зонах (на примере почв Прииссыкулья, Ак-Тюзского рудника), разработанные с использованием комплексных индексов, коэффициентов и подхода ТРИАД;
2. Фитотолерантные и фиточувствительные виды для фитотестирования и фиторемедиации нефтезагрязненных почв в условиях г.Балыкчы;
3. Фитоиндикационные параметры облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides* L.) для оценки рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы озера Иссык-Куль;
4. Современное экологическое состояние озера Иссык-Куль по уровню его трофического состояния, степени трансформированности прибрежных буферных зон;
5. Интегрированные индексы качества и уязвимости экосистемы озера Иссык-Куль, и разработанные оценочно-прогнозные картографические модели;
6. Современная модель системы экологического мониторинга экосистемы озера Иссык-Куль;
7. Технологические решения для снижения уровня загрязнения и рециклинга нефтезагрязненных грунтов и твердых бытовых отходов (ТБО).
8. Подходы к применению местных видов высокогорных растений для фиторемедиации нефтезагрязнённых почв на завершающей стадии ремедиации и рекультивации промышленных зон, в условиях высокогорных территорий.

Личный вклад соискателя. Диссертация представляет собой оригинальную научную работу, которая обобщает результаты теоретических и экспериментальных исследований, в которых автор принимал непосредственное участие, в качестве исполнителя. Автор играл ключевую роль в выборе направления исследования, формулировании задачи, моделировании изучаемых процессов и осуществлял научное обоснование и интерпретацию полученных результатов. Вклад автора является решающим и включает активное участие на всех этапах исследования, обсуждения результатов, подготовке научных статей и докладов.

Апробация результатов диссертации. Материалы исследований по теме диссертации докладывались на: Международной научно-практической конференции «Сохранение экосистем Центральной Азии и устойчивое развитие: принципы, вызовы, перспективы» (Бишкек, КР, 2024), 6th International Black Sea Modern Scientific Research Congress (Trabzon Turkiye, 2024), II-Международной научно-практической конференции “Современные проблемы биоразнообразия, экологии и биобезопасности Биосферной территории “Ысык-

Кёль” (Бишкек, КР, 2021), X Международной научно- практической конференции “Экология речных бассейнов” (Владимир, РФ, 2021), Международной конференции «Экологический мониторинг: методы и подходы» и XX Международном Симпозиуме “Сложные системы в экстремальных условиях” (Красноярск, РФ, 2021).

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме диссертации опубликованы 30 научных трудов и научных докладов, из них 10 в рецензируемых журналах НАК КР, 12 в журналах индексируемых в базе данных Web of Science и SCOPUS, 7 в журналах индексируемых в РИНЦ, 1 в материалах международной научно- практической конференции, получено 1 авторское свидетельство, 3 актов внедрения и 2 рационализаторских предложения.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав: обзор литературы, методология и методы исследования, 3 главы собственных исследований, заключения, перечня сокращений и обозначений, принятых в работе, списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 220 страницах компьютерного текста, включают 39 таблиц, 76 рисунков, 7 приложений. Количество использованных библиографических источников составляет 467 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность выбранного направления исследования, определены цель и задачи диссертационной работы, а также продемонстрированы научная новизна и практическая значимость полученных результатов. Формулируются основные положения, выносимые на защиту, и приводятся сведения об апробации и публикациях результатов исследований.

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ посвящен анализу литературных данных современного экологического состояния водных и почвенных факторов устойчивого развития Кыргызстана и в целом в мире. В настоящее время ведущие умы мира и международные организации активно ищут стратегии для преодоления экологического кризиса, который приводит к изменению климата, деградации водных и земельных ресурсов, опустыниванию, сокращению биоразнообразия и другим серьезным проблемам. Множество предложенных критериев, стратегий и подходов, рассмотренные в данном литературном обзоре, должны быть адаптированы к конкретным условиям, что требует поиска решений, соответствующих локальным экологическим, социальным, экономическим особенностям и различиям.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Объект исследования. Техногенные экосистемы, природные горные ландшафты, прибрежные экосистемы, экосистемы городской среды (рисунок 2.1).



Рисунок 2.1 Объекты экспериментальных исследований

Предмет исследования. Водные и почвенные ресурсы, исследуемых природных и техногенных объектов, основанных на экологических индексах и индикаторах.

Методы исследования. В связи с комплексностью проведенных исследований в данном разделе методы исследования приведены в структурированном виде, сгруппированном по следующим блокам: методики оценки состояния водных и почвенных ресурсов, методики ремедиации загрязненных почв, методы рециркуляции очищенных грунтов и рационального использования природных ресурсов. Статистическая обработка данных проводилась общепринятыми методами вариационной статистики на основе анализа абсолютных и относительных величин. Блок-схема проведения экспериментальных исследований представлена на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 Блок-схема экспериментальных исследований

ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ И ИНДИКАТОРОВ

посвящена рассмотрению актуальных экологических проблем почвенных экосистем Кыргызской Республики, а также приведены научно обоснованные аргументы в пользу перехода от традиционных методов оценки предельно допустимых концентраций (ПДК) к более комплексным, интегрированным и междисциплинарным подходам, позволяющим более точно определить экологическое состояние почвенных экосистем и установить соответствующие экологические критерии. Глава дополнена экспериментальными данными, подтверждающими необходимость и целесообразность использования экологических индексов и индикаторов для интегрированной оценки состояния как природных, так и техногенных экосистем. Это необходимо для разработки эффективных мер по их защите и восстановлению, включая почвенные экосистемы, как техногенного, так и естественного происхождения.

3.1 Экологическое состояние почвенных ресурсов Кыргызстана и системы оценивания их экологического состояния. Одним из приоритетов страны является обеспечение устойчивого развития страны, в которой экологическая безопасность, как составная часть национальной безопасности страны, выступает основой сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Однако страна имеет ряд существенных экологических проблем, согласно данным Национального центра по борьбе с опустыниванием из 10,6 млн. га сельскохозяйственных земель более 88% оказались деградированными и подверженными опустыниванию, площади повторного засоления почв увеличились и составляют 75% всех пахотных земель, более 50% пастбищ классифицируются как средне и сильно деградированные. Источниками загрязнения и ухудшения экологического состояния почвенных экосистем страны являются: промышленность, сельское хозяйство и полигоны отходов производств и человеческой деятельности.

3.2 Экспериментальные исследования применения многокритериальных экологических индексов для комплексной оценки почвенных экосистем севера Кыргызстана. Были апробированы различные экологические индексы для оценки экологического состояния урбанизированных экосистем Иссык-Кульской области на загрязнение тяжелыми металлами, которое оценивали с помощью индексов коэффициент обогатления (EF), индекс геоаккумуляции (I_{geo}), коэффициент загрязнения (CF), степень загрязнения (Cd), индекс потенциального экологического риска

(PER) и индекс экологического риска (RI) с использованием подхода ТРИАД. Образцы почвы были проанализированы на содержание Pb, Zn, Fe, Cu и Cd. Содержание тяжелых металлов в почвах Иссык-Кульской области, представленное в таблице 3.2.1, показывает, что Zn и Pb были выше во всех исследуемых зонах, в то время как значения Cu и Cd были ниже в западной зоне. На рисунке 3.2.1 показаны карты пространственного распределения Co, Cu, Pb и Zn в почве. Красные цвета показывают более высокие концентрации тяжелых металлов на геохимических картах, в то время как зеленые цвета указывают на низкие концентрации.

Таблица 3.2.1 - Средние значения содержания тяжелых металлов в почве.

Зоны Иссык-Куля	Pb	Cd	Cu	Zn	Fe
Западная зона	32 ± 3.27	0.3 ± 0.08	18 ± 1.63	60 ± 5.89	233 ± 7.89
Северная зона	28.5 ± 8.28	0.55 ± 0.29	22 ± 3.21	61.3 ± 13.46	316.7 ± 5.87
Южная зона	29.4 ± 8.82	0.56 ± 0.21	20.5 ± 5.68	65.1 ± 5.21	342.5 ± 4.19
Восточная зона	24.6 ± 4.44	0.55 ± 0.15	21.4 ± 4.82	69.9 ± 6.62	308.6 ± 7.87
Фон	21.7 ± 9.61	0.50 ± 0.15	22.7 ± 6.43	41.3 ± 10.26	380 ± 9.87

Среднее и стандартное отклонение, $\bar{X} \pm SD$

Характер распределения Co и Cu указывает на низкую пространственную неоднородность. Судя по картам, самые высокие концентрации выбранных тяжелых металлов в образцах почвы были обнаружены вблизи промышленных предприятий. деятельности, такой как транспорт и сельское хозяйство.

Значения коэффициента обогащения для исследуемых районов представлены в табл. 3.2.2

Таблица 3.2.2 - Коэффициент обогащения почвы на исследуемой территории

Зоны Иссык-Куля	Pb	Cd	Cu	Zn
Западная зона	2.41	0.98	1.29	1.14
Северная зона	1.58	1.32	1.17	0.85
Южная зона	1.50	1.24	1.01	0.84
Восточная зона	1.40	1.35	1.17	1.00

Коэффициенты обогащения в западной зоне располагались в следующем порядке: Pb (2.41) > Cu (1.29) > Zn (1.14) > Cd (0.98). Во всех остальных зонах значения коэффициентов обогащения следовали в следующей последовательности: Pb > Cd > Cu > Zn. В западной зоне Pb имел самый высокий

коэффициент обогащения, что позволило классифицировать почву как умеренно обогащенную Pb. Исходя из классификации, значения коэффициентов обогащения Cu, Zn и Cd в западной зоне были ниже 2 ($EF < 2$), что свидетельствует о минимальном обогащении. Исходя из коэффициента обогащения, остальные исследованные почвы были минимально обогащены Pb, Cd, Cu и Zn, за исключением северных и южных почв, которые были незагрязнены Zn.




Рисунок 3.2.1 Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах Прииссыккуля.

Рассчитанные значения I_{geo} для токсичных металлов в почвах, собранных из четырех зон Исык-Куля, представлены в табл. 3.2.3. Во всех зонах значения I_{geo} следовали в следующем порядке: $Zn > Pb > Cu > Cd$. В целом, Zn, Pb и Cu имели самые высокие значения индекса I_{geo} во всех зонах исследования. Самое высокое значение индекса геоаккумуляции Pb наблюдается в западной зоне (8.85) и южной зоне (8.73), а Zn - в восточной зоне (10.91) и южной зоне (10.81). На основании индекса геоаккумуляции во всех зонах почва классифицируется как очень загрязненная Zn, Pb и Cu. Отрицательные значения, наблюдаемые для Cd, свидетельствуют о низком уровне загрязнения.

Таблица 3.2.3 - Индексы геоаккумуляции (Igeo) тяжелых металлов в почве на исследуемой территории

Зоны Иссык-Куля	Pb	Cd	Cu	Zn
Западная зона	8.85	- 3.32	8.09	10.69
Северная зона	8.69	- 2.45	8.38	10.72
Южная зона	8.73	- 2.42	8.28	10.81
Восточная зона	8.48	- 2.45	8.34	10.91

Таблица 3.2.4 - Коэффициенты загрязнения (Kз) и степень загрязнения (Cз) тяжелыми металлами на исследуемой территории.

Зоны Иссык-Куля	Pb	Cd	Cu	Zn	Cdegree
Западная зона	1.47	0.60	0.79	1.45	4.32
Северная зона	1.31	1.10	0.97	1.48	4.87
Южная зона	1.35	1.12	0.90	1.58	4.95
Восточная зона	1.13	1.10	0.94	1.69	4.87

Как видно из таблицы 3.2.4 Zn имел высокие значения загрязнения 1.69 в восточной зоне, в то время как в других зонах значения колебались в пределах 1.45-1.58, что также относится к умеренному загрязнению. Pb, Zn, Cd во всех зонах классифицируются как умеренно загрязненные, за исключением западной зоны, где почва слабо загрязнена Cd.

Cu имел наименьшие значения коэффициента загрязнения во всех зонах 0.79-0.94 и классифицировалась как слабо загрязненные.

Коэффициенты загрязнения в западной зоне в порядке возрастания следовали аналогичной тенденции: Pb> Zn> Cu> Cd, а в других исследованных зонах: Zn> Pb> Cd> Cu.

По степени загрязнения почв Иссык-Куль относится к слабозагрязненным тяжелым металлам. Значения степени загрязнения составляют 4.32; 4.87; 4.95 и 4.87 соответственно в западной, северной, южной и восточной зонах.

Таблица 3.2.5 - Индекс нагрузки загрязнения (PLI) тяжелыми металлами на исследуемой территории.

	Западная зона	Северная зона	Южная зона	Восточная зона
PLI	0.25	0.52	0.54	0.50

Данные табл.3.2.5, показывают, что в исследуемых зонах значения PLI варьировали в диапазоне 0.25-0.54, что ниже 1 и свидетельствует об отсутствии загрязняющей нагрузки.

Таблица 3.2.6 - Потенциальный экологический риск (PRI) тяжелых металлов на исследуемой территории.

Зоны Иссык-Куля	Ei				PERI
	Pb	Cd	Cu	Zn	
Западная зона	7.37	18.00	3.96	1.45	30.79
Северная зона	6.57	33.00	4.85	1.48	45.90
Южная зона	6.77	33,60	4.52	1.58	46.47
Восточная зона	5.67	33.00	4.71	1.69	45.07

Потенциальный экологический риск (PERI) отдельных тяжелых металлов в образцах почвы был оценен и представлен в табл. 3.2.6. Во всех зонах значения потенциального экологического риска варьируют от 30.79 до 46.47 и свидетельствуют о низком уровне риска.

Экологическая оценка почвы по методу ТРИАД была апробирована в западной зоне Иссык-Кульской области. Этот регион является важным транспортным узлом области и обуславливает высокий риск загрязнения почвы тяжелыми металлами. При изучении влияния транспортного загрязнения на почвенные микроорганизмы наблюдалось снижение численности и видового разнообразия всех изученных групп микроорганизмов, за исключением грибов, что свидетельствует об их толерантности к данному виду загрязнения. Численность актиномицетов была незначительной. Наблюдались секции *Cinereus*, *Helvolo Flavus* и *Roseus*. Штаммы микромицетов были идентифицированы как *Aspergillus*, *Fusarium* и *Penicillium*.

Тест-культуры показали высокую чувствительность к тяжелым металлам, и в нашем исследовании они были установлены в следующем порядке: *Raphanus sativus* < *Lepidium sativa* < *Avéna sativa*. Наиболее чувствительными оказались семена *Raphanus sativus*, прорастание которых составило 7%.

Продемонстрирована высокая токсичность, вызывающая прорастание семян *Raphanus sativus* более чем на 50%, что подтверждает наибольшую информативность биотического контроля токсичности природных сред.

На рисунке 3.2.2 представлены результаты химических, токсикологических и биоиндикационных данных.

Результаты данного исследования показали значительные колебания концентраций тяжелых металлов в пределах исследуемой территории. Концентрации тяжелых металлов в почвах Иссык-Куля располагались в следующем порядке возрастания: Zn > Pb > Cu > Cd. Такие показатели, как коэффициент обогащения и коэффициент загрязнения, показали, что почвы Иссык-Куля умеренно загрязнены Pb, Zn и Cd; геоаккумуляция выявила экстремальное загрязнение Pb, Zn и Cu. Потенциальный экологический риск

оценивается как низкий, в то время как подход ТРИАД характеризует почву как сильно загрязненную и показывает, что использование биотических компонентов при оценке степени загрязнения является информативным.




Рисунок 3.2.2 Рассчитанные индексы риска (RI): химический (ChemRI), экотоксикологический (EcotoxRI), экологический (EcoRI)

Результаты данного исследования показывают, что необходимо принять адекватные меры по ограничению и регулированию деятельности человека в районе озера Иссык-Куль, чтобы защитить почву от дальнейшего ухудшения и загрязнения. Важен правильный выбор информативных методов, позволяющих оценить реальное состояние экосистемы. Различные экологические индексы, оценивающие состояние урбанизированных экосистем, показали разную степень влияния. Такие индексы, как коэффициент обогащения, коэффициент загрязнения, геоаккумуляция и потенциальный экологический риск, указывают в основном на загрязнение почв определенными тяжелыми металлами, а метод ТРИАД, оценивающий состояние среды по трем основным показателям (химическим, экотоксикологическим и биоиндикационным), позволяет наиболее достоверно оценить экологическое состояние сложной почвенной экосистемы. Подтверждая, что для комплексной оценки состояния почвенной экосистемы важно учитывать состояние биоты как неотъемлемой части оцениваемой экосистемы.

Фитотестирование и фиторекультивация нефтезагрязненных почв с помощью фитотолерантных растений. Проведено фитотестирование растений в нефтезагрязненной почве города Балыкчы, для изучения возможностей применения высших растений в качестве одного из звеньев

технологической цепочки рекультивации почв. В качестве тест-объектов были использованы: кукуруза сахарная (*Zéa máys*), овес обыкновенный (*Avéna satíva*), горох посевной (*Lathyrus oleraceus*), эспарцет виколистный (*Onobrychis viciifolia*), подсолнечник масличный (*Heliánthus ánnuus*), костер полевой (*Brómus arvensis*), мятлик луговой (*Poa praténse* L.). Содержание нефтепродуктов в исследованной почве составило 7067,5 мг/кг, в фоновом образце почвы 60 мг/кг.

Первые проростки растений появились на 4-7-е сутки (рисунок 3.2.5). Высокая всхожесть произрастания наблюдалась у кукурузы сахарной (*Zéa máys*) (88,3%) и овса обыкновенного (*Avéna satíva*) (85 %). Остальные виды растений по всхожести расположились в следующем порядке: горох посевной (*Lathyrus oleraceus*) (67,86%)> эспарцет виколистный (*Onobrychis viciifolia*)> (55%)> подсолнечник масличный (*Heliánthus ánnuus*) (45%)> костер полевой (*Brómus arvensis*)> (38,3)> мятлик луговой (*Poa praténse* L.) (21,7%).




Рисунок 3.2.5 Всхожесть кукурузы (*Zéa máys*) на 7-е и 14-е сутки

Примечание: а) на 7-е сутки, б) на 14-е сутки

В исследуемой почве у мятлика лугового (*Poa praténse* L.) и костра полевого (*Brómus arvensis*) отмечен наименьший рост корня в сравнении с фоновыми показателями, что обуславливает их корневую систему чувствительной к нефтяному загрязнению (рис.3.2.6). Как видно из рис. 3.2.7 однодольные и двудольные растения не различаются превышением длины корня к длине побега проростков. Однако, наиболее адекватную оценку фитотоксичности почв дали однодольные растения – овес обыкновенный (*Avéna satíva*), мятлик луговой (*Poa praténse* L.), костер полевой (*Brómus arvensis*) и кукуруза сахарная (*Zéa máys*).

Таким образом, проведенные исследования показали, что тест-культуры растений по-разному реагируют на нефтяное загрязнение. Наиболее толерантными к загрязнению нефтепродуктами оказались кукуруза сахарная (*Zéa máys*), овес обыкновенный (*Avéna satíva*), горох посевной (*Lathyrus oleraceus*) и эспарцет виколистный (*Onobrychis viciifolia*), с показателями всхожести 88,3%, 85%, 67,86% и 55% соответственно. Эти результаты

свидетельствуют о том, что указанные виды могут быть эффективно использованы для фиторекультивации супесчаной почвы при умеренном уровне загрязнения нефтепродуктами.




Рисунок 3.2.6 Всхожесть тест – культур на 21 сутки, %

Примечание: НП - нефтезагрязненная почва.




Рисунок 3.2.7 Средние отношения длины корня к длине побега тест-культур

Изучение возможности использования фитоиндикации рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы оз.Иссык-Куль показали возможность применения облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides* L.) в качестве фитоиндикатора рекреационной нагрузки на экосистемы озер. Информативными оказались такие показатели как изменения листовой пластины и соотношение женских и мужских особей в сообществе. Несмотря на визуальное обилие кустарников в наиболее нагруженных зонах побережья озера Иссык-Куль, при детальном исследовании и сравнении в

кустарниками произрастающими в заповедной зоне показали существенное их различие по морфологическим признакам.

Между средними показателями длины плода и длин плодоножек связей не выявлено. По средним показателям длины плода площади изучения расположились в следующем порядке: самыми длинными плодами обладали кустарники в пунктах Бостери и Чолпон-Ата, имеющие 7,8 мм, самый меньший показатель отмечен в пункте Чоң-Сары-Ой - 7,2 мм, а в контрольном варианте – 7,3 мм. Диапазон изменчивости составил – 0,6 мм.

Диаметр плода является одним из важных критериев с экономической точки зрения. Наши исследования показали, что образцы пункта Чолпон-Ата обладали наибольшими диаметрами плода, среднее значение которого составило 6,7 мм. Показатели из всех остальных пунктов оказались в диапазоне 5,1-5,9 мм, при этом диапазон изменчивости составил 1,6 мм (табл.3.2.14). Следующим показателем, вызывающим интерес является масса плода. Во всех исследованных образцах масса плода варьировала в пределах 0,6-0,2 гр, и характеризуются как мелкоплодные.

Таблица 3.2.14-Биометрические показатели плодов облепихи Приисыккуля

№ п/ п	Места сбора	Средние величины параметров							
		Длина плодоножки		Длина плода		Диаметр плода		Масса плода	
		Средние значения $M \pm m$, мм	C_v , %	Средние значения $M \pm m$, мм	C_v , %	Средние значения $M \pm m$, мм	C_v , %	Средн ие значе ния $M \pm m$, гр	C_v , %
1	Оттук	3.8 ± 0.2	2.1	7.3 ± 0.6	0.7	5.1 ± 0.4	1.0	0.2 ± 0.1	10.0
2	Тамчы	3.0 ± 0.3	2.6	7.6 ± 0.5	0.6	5.4 ± 0.5	0.9	0.6 ± 0.4	3.3
3	Чон- Сары- Ой	2.8 ± 0.2	0.5	7.2 ± 0.7	0.7	5.9 ± 0.4	0.8	0.4 ± 0.3	5.0
4	Чолпо н-Ата	3.2 ± 0.3	1.9	7.8 ± 0.7	0.6	6.7 ± 0.6	0.7	0.2 ± 0.3	10.0
5	Бостер и	2.5 ± 0.3	3.2	7.8 ± 0.6	0.6	5.9 ± 0.5	0.8	0.2 ± 0.2	10.0
Ср.взв величины		3.1		7.5		5.8		0.4	

Несмотря на то, что средний диаметр плода в пункте Чолпон -Ата был больше, чем в остальных пунктах, оказалось, что это не влияет на массу плода, среднее

значение которых составила 0,2 гр. В условиях повышенного антропогенного давления на экосистемы заросли облепихи подвергаются механическим повреждениям, что приводит к их угнетению, в особенности женских особей облепихи. Как видно из рис. 3.2.10, процентное содержание женских особей было низким и варьировала в пределах 20 до 30% в сильно подверженных антропогенному воздействию. А в заповедной зоне (Оттук), процент содержания женских особей составил 46%, что на 4% больше чем мужских особей, а в пункте Булан-Соготту, процентное содержание женских особей был близок к контрольному варианту и составил 45%, этот пункт оценен как менее нагруженный.




Рисунок 3.2.10 Процентное содержание мужских и женских особей в исследуемых пунктах

Следовательно, процентное содержание мужских и женских особей в прибрежной зоне может служить наиболее информативным фитоиндикатором степени антропогенного воздействия на экосистему озера.

Таким образом, можно предположить, что умеренная, дозированная нагрузка, с учетом экологической емкости среды, на экосистему озера ключ к устойчивому и долговременному использованию экосистемных услуг и получения долгосрочной прибыли для местного сообщества, а фитоиндикационные показатели облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides* L.) могут служить оперативными показателями степени нагружаемости прибрежных экосистем и успешно использованы при оценке экологического состояния прибрежных зон, а также могут быть использованы при разработке интегрального плана управления. Определение указанных фитоиндикационных показателей оперативны, достоверны, сравнительно малозатратны, могут быть оценены в полевых условиях инспекторами экологических служб.

ГЛАВА 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ И ИНДИКАТОРОВ посвящена рассмотрению актуальных экологических проблем водных экосистем Кыргызской Республики. В главе анализируются данные характеризующие качество вод рек Нарын, Кара-Кече и озера Иссык-Куль и приводятся аргументы о необходимости применения экологических индексов для оценки их качества.

4.1 Экологическое состояние водных экосистем Кыргызстана и системы оценивания их экологического состояния. Исследования оценки качества воды озера Иссык-Куль показали, что измеряемые физико-химические параметры не достаточны для анализа его трофического статуса, и нуждаются в поиске более комплексных подходов его оценки. По официальным данным, основанным на показателях гидрохимического анализа, гидрохимический состав воды озера Иссык-Куль неизменен, что соответствует требуемым нормам.

4.2 Анализ экологического состояния озера Иссык-Куль и рек Кыргызстана с помощью экологических индексов. Оценка экологического состояния оз.Иссык-Куль по индексу состояния трофического уровня (TLI). Однако, детальные рекогносцировочные обследования проведенные нами показали, что качество воды озера имеет тенденцию к загрязнению. На рис.4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 приведены фотографии сделанные летом 2020, летом 2022 года и летом 2024 года, ситуация явно не из лучших. Были проведены детальные исследования оценки качества воды озера, с использованием параметра “хлорофилла-а”. Было установлено, что трофический статус озера в 43% исследованных зонах имеет тенденцию сдвига с олиготрофности в сторону мезотрофности, подтверждая о необходимости применения индекса TLI для получения более точной информации о состоянии водных экосистем.

Таблица 4.2.1- Показатели состояния оз.Иссык-Куль по индексу TLI, 2017 год

Пункты	Точка отбора	TN	TP	SD	TLI	
Балыкчы	1a	53.5	27.3	30	36.9	Мезот
Чок-Тал	4a	45.0	24.1	25	31.3	Мезот
Чолпон-Ата	5a	36.0	20.0	15	23.6	Олигот
Григорьевка	6a	34.4	14.1	20	22.8	Олигот
Бостери	7a	49.5	20.0	27	32.1	Мезот
Тюп	13a	45.0	32.2	27	34.7	Мезот

Детальный анализ показателей, данных табл. 4.2.1 и 4.2.2 показывает, высокий показатель индекса TLI (TN) в заливе Балыкчы и в районе с.Чок-Тал, что свидетельствует об изменении ультраолиготрофного статуса и перехода его в эвтрофный статус, причиной которой могут являться повышенное поступление биогенных элементов в озеро. Источниками которых могут быть как рекреационные нагрузки, так и сельскохозяйственная деятельность.



Рисунок 4.2.1 Качество воды оз.Иссык-Куль, 2020г



Рисунок 4.2.2 Качество воды оз.Иссык-Куль, 2022г.



Рисунок 4.2.3 Качество воды оз.Иссык-Куль, 2024 г.

Анализ результатов по фосфору TLI(TP) показал, что наибольший его показатель содержался в образцах проб в г.Чолпон-Ата (49). Самое низкое же его значение зафиксировано в районе пгт. Каджи-Сай. Расчет индекса TLI (Chl-a) показал высокое содержание его в пункте с.Чок-Тал. Знание трофического статуса имеет фундаментальное значение для понимания состояния и функционирования озерных экосистем.

Таблица 4.2.2- Показатели состояния оз.Иссык-Куль по индексу TLI, 2022 г

Пункты	Точка отбора	TN	TP	SD	Chl-a	TLI	
Кажы-Сай	9с	47	30	25	44	36,4	Мезот
Балыкчы	1а	49	32	31	64	45,3	Эвтроф
Чок-Тал	4а	49	30	29	87	48,6	Эвтроф
Чолпон-Ата	5а	49	37	26	50	41,2	Эвтроф
Григорьевка	6а	38	36	34	51	40,3	Мезот
Бостери	7а	37	39	36	54	41,2	Мезот

С целью интерполирования пространственного распределения некоторых свойств качества воды оз.Иссык-Куль были разработаны три различные модели: Стабильная, Гауссовская и Рационально-квадратичная. Низкие значения коэффициента надежности указывают на то, что выбранная схема отбора проб и расстояния между ними подходят для моделирования пространственной изменчивости свойств воды. В то время как величина показателя надежности объясняет ошибку при отборе и анализе переменных, нулевое значение параметра надежности объясняет отсутствие ошибки измерения и изменчивости на коротких расстояниях. Результаты показали, что все модели являются надежными (табл. 4.2.3).

Согласно построенным картам пространственных изменений, концентрация нитратов в озере Иссык-Куль варьирует в пределах 0-0.9 мг/л, при этом установлено, что она сосредоточена в восточной части озера (рисунок 4.2.7).

Концентрация фосфора в озере варьировала в пределах 0-0.0067 мг/л, фосфор был сконцентрирован в северо-восточной части озера (рисунок 4.2.8).

Концентрация, хлорофилла-а в озере колебалась в пределах 0-1.87 мг/л и сосредоточена в северо-западной части озера (рисунок 4.2.9).

Таблица 4.2.3- Свойства некоторых Kriging-моделей индекса качества воды

Параметры	Модель	Регресс функция	Nugget, Co	Range, A	Sill, Co+C	Nugget/Sill, %	ME1	RMSSE2
TN	Stable	$-2.15 * x + 0.96$	0	1	0.06	0.00	0.1	1.01
TP	Gaussian	$-164.59 * x + 0.73$	0	1.07	0	0	0.0002	0.9
Chl-a	Rational Quadratic	$-0.42 * x + 3.02$	0,1	0.48	107.87	0.1	7.82	0.7




Рисунок 4.2.7 Пространственное распределение концентраций нитратов




Рисунок 4.2.8 Пространственное распределение концентраций PO_4




Рисунок 4.2.9 Пространственное распределение концентраций Chl-a

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, трофический уровень озера от ультраолиготрофного постепенно, в наиболее урбанизированных местах, переходит в мезотрофное состояние. Если в 2017 году все исследованные точки имели статус ультраолиготрофных, за исключением одной точки (Балыкчи) - статус которой был олиготрофным, то в 2022 году

статус ультраолиготрофных пунктов не был зафиксирован, две точки перешли в мезотрофный статус.

4.3 Экологическое состояние прибрежных буферных экосистем озера Иссык-Куль и их роль в устойчивом развитии. Было проанализировано экологическое состояние прибрежных буферных экосистем озера Иссык-Куль и их роль в устойчивом развитии.

Проведенные исследования, показали, что с 2000 года идет тенденция снижения площади прибрежных буферных земель (табл. 4.3.1).

Таблица 4.3.1 Площадь преобразованных прибрежных буферных зон на расстоянии 100 м и 500м, га

Трансформация ПБЗ	2012г.	2017г.	2021г.
всего на расстоянии 100 метров имеется 2306 га земель			
застройки на расстоянии 100 м	104.52	220.71	329.6
всего на расстоянии 500 метров имеется 8551 га земель			
с/х земли на расстоянии-500 м	2429	2189.65	2116.4
застройки на расстоянии 500 м	446	663.78	910.09

Данные табл.4.3.1 показывают, что прибрежные буферные зоны (ПБЗ) заметно уменьшаются, с 2010 года на расстоянии 100 метров от береговой линии застроено ПБЗ 14.5%, а на расстоянии 500 метров застроено всего 35.6% ПБЗ или 64.4% составляют естественные экосистемы. Если учесть, что для сохранения самовосстанавливающей способности рекомендуется сохранить 70% экосистем, то превышение преобразования уже составляет 5.6%.

Согласно анализу, прибрежные буферные зоны были трансформированы для следующих целей: 104.52 в 2012 году, 220.71 в 2017 году и 333.4 га на 100 м площади застройки в 2021 году. Для пашни на 500 метров в 2012 году - 2 429, в 2017 году - 2 189.65, в 2021 году - 2 135.18. В 2012 году - 446, в 2017 году – 663.78, в 2021 году – 910.09 га земли под застройку (жилые дома, гостевые дома, санатории, кафе). Следовательно, прибрежная растительность была вырублена в основном под застройку.

Нерациональное преобразование прибрежных экосистем озер приводит к целому ряду экологических проблем, в том числе риску потери качества воды и эвтрофикации водоемов. Какова должна быть оптимальная ширина прибрежной буферной зоны? Для ответа на поставленный вопрос был использован метод “соотношение цены – выгоды”, в котором оптимальная ширина буферной зоны рассчитывалась на основе экономико-экологических выгод и экономической стоимости инвестиций на восстановление преобразованного ландшафта. Были смоделированы влияния изменения

структуры буферной зоны на качество воды озера путем разработки сценариев экологических измерений.

Согласно статистическим данным на 2012-2022 годы, необходимо вернуть 333.4 га застроенных земель под кустарники или пастбища, чтобы предотвратить усиление процесса эвтрофикации и сохранить устойчивый рекреационный потенциал озера. В наших условиях, на примере озера Иссык-Куль, ширина буферной зоны для экосистем варьировала от 200 м в наименее урбанизированных зонах до 600 м в наиболее урбанизированных. Результаты значения величины δ позволяют сделать вывод, что с увеличением степени трансформации прибрежные территории теряют свою экологическую ценность, и затраты на их восстановление возрастают, стало быть для сохранения экологического баланса потребуется большая ширина прибрежной буферной зоны.

4.4 Экологические риски преобразования прибрежных экосистем в агроландшафты и последствия для устойчивого развития оз. Иссык-Куль. Из преобразовываемых ландшафтов только образцы с абрикосовыми полями имели более близкий к естественным облепиховым зарослям свойства почв, однако необходимо учитывать, что при выращивании плодовых культур, могут быть использованы различные гербициды, инсектициды и пестициды, причем неоднократно.

4.5 Определение ширины прибрежной буферной зоны озера Иссык-Куль с использованием метода “соотношения выгоды и затрат”. Также исследования показали, что трансформация прибрежных буферных зон имеет прямую корреляцию с увеличением в воде хлорофилла-а табл.4.5.1

Таблица 4.5.1 - Зависимость трансформации на значение индекса TLI

Годы	Средний TLI	% преобразованных площадей на расстоянии 100м	% преобразованных площадей на расстоянии 500м
2017	23.42	9.57	33.37
2022	37.34	14.46	35.61

Как видно из табл.4.5.1 с увеличением процента трансформированных земель растет и индекс трофического уровня воды оз.Иссык-Куль, что показывает значимость лимитирования трансформирования прибрежных буферных земель для устойчивого развития и использования экосистемы озера.

Для сохранения природной экосистемы и обеспечения устойчивого развития и получения выгод от экосистемных услуг не нанося ему ущерба необходимо владеть полной информацией о состояниях, возможных последствиях

принимаемых действий, для достижения чего ключевым фактором является правильно организованный экологический мониторинг. На основании полученных данных была разработана научная разработка информационной системы экологического мониторинга оз.Иссык-Куль (ИСЭМ), позволяющая получать информацию и автоматизированно рассчитывать индекс TLI, ширину прибрежной буферной зоны озера, в зависимости от преобразования прибрежных буферных зон, на базе Инженерного факультета КТУ Манас. Полученные результаты данных исследований показывают о важности и необходимости внесения изменений в национальную программу экологического мониторинга оз.Иссык-Куль, включением в ее программу определение показателя хлорофилл-а, а также изменением тактики управления прибрежными экосистемами для по определению неприкасаемых прибрежных буферных зон экосистемы озера для сохранения качества и баланса саморегулирования оз.ИссыкКуль и обеспечения его устойчивого развития. Предложено внести изменения в национальную программу экологического мониторинга, дополнив его показателем “хлорофилл-а”, индексом TLI, организацией наблюдения за трансформирование прибрежной буферной зоны озера, разработаны и внедрены в производство (Департамент биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов экологии и технического надзора КР, Дирекция Биосферной территории “Ысык-Кель”) практические рекомендации “Оптимизация системы экологического мониторинга оз.Иссык-Куль” и методика отбора проб и определения хлорофилла-а.Разработанные научные разработки позволят не только собирать аналитические данные, но и позволят анализировать и принимать соответствующие меры предотвращающие ухудшение экологического состояния экосистемы озера.

4.6 Интегрированный индекс уязвимости как основа устойчивого развития прибрежной зоны: анализ на примере озера Иссык-Куль. С целью определения и оценки уязвимости прибрежных экосистем, на примере прибрежной экосистемы оз.Иссык-Куль был определен интегрированный индекс прибрежной уязвимости (ICVI), в расчете которого был использован индекс прибрежной уязвимости (CVI) и социально-экономический индекс уязвимости (SVI). Влияние человеческой деятельности на прибрежную территорию оз.Иссык-Куль был оценен количественно путем расчета социально-экономического индекса (SVI) изучаемого района. SVI иллюстрирует степень угрозы социально-экономических факторов для прибрежных территорий. Данный анализ проводился путем сбора материала, статистических данных и подсчета индекса SVI для каждого административно-территориального района Иссык-Кульской области. Согласно проведенным

расчетам, степень уязвимости, связанная с количеством рекреационных объектов вокруг озера Иссык-Куль, является самой высокой для всех районов, кроме Тютского. Степень уязвимости, связанная с землепользованием, высока для всех районов. Интенсивное земледелие в прибрежной зоне приводит к трансформации природного ландшафта побережья. Антропогенное воздействие - урбанизация территории, развитие промышленности, транспорта, выпас скота, орошение земель являются негативными факторами, угрожающими экологической безопасности Иссык-Кульской области. Загрязненные участки, связанные с результатами деятельности горнодобывающей промышленности, представляют высокий риск с точки зрения экологических последствий.




Рисунок 4.6.3 Пространственная изменчивость индекса социально-экономической уязвимости (SVI) побережья оз.Иссык-Куль

По социально-экономической уязвимости значения SVI варьировались следующим образом: Иссык-Куль (237,2) > Тон (158,1) > Ак-Суу (125,0) > Тют (42,43) > Джеты-Огуз (24,49). Тютский и Джеты-Огузский районы имеют более слабую степень уязвимости из-за низкой плотности населения, отсутствия современной инфраструктуры и промышленности (рисунок 4.6.3). При попарном сравнении социально-экономических переменных приоритетными параметрами являются плотность населения, прибрежное землепользование и количество рекреационных и промышленных объектов. К сожалению, статус особо охраняемых природных территорий вдоль побережья озера Иссык-Куль не в полной мере справляется со своими обязательствами по обеспечению охраны ООПТ.

Определение степени защищенности подземных вод Прииссыккуля, было выполнено в соответствии с методикой В. М. Гольдберга, внесенной модификациями, предложенными К. А. Кожобаевым. Для оценки использовались баллы, которые определялись на основе таких параметров, как толщина слабопроницаемых отложений, глубина уровня подземных вод,

литология и фильтрационные характеристики пород, применяя уравнение, предложенное Кожобаевым К.А. По которым составлена карта «Степень защищенности подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов», с использованием программы MapInfo (рисунок 4.6.4).




Рисунок 4.6.4 Карта «Степень защищенности подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов» Прииссыкулья.

Влияние береговых факторов на побережье оз.Иссык-Куль (CVI), был оценен с учетом трех переменных (тип береговой линии, реки и степень защиты грунтовых вод), влияющих на уязвимость прибрежных районов. При оценке уязвимости побережья озера значения CVI варьируются следующим образом: Иссык-Куль (15,49) > Тон (15,49) > Джеты-Огуз (8,66) > Тюп (7,75) > Ак-Суу (5,0) (рисунок 4.6.5).




Рисунок 4.6.5 Пространственная изменчивость индекса уязвимости побережья (CVI) оз.Иссык-Куль

Прибрежные зоны Иссык-Кульского и Тонского районов имеют высокий уровень уязвимости, так за чертой прибрежных зон расположены много зданий туристических объектов. Определив значения двух предыдущих индексов SVI

и CVI был рассчитан интегрированный индекс уязвимости побережья оз. Иссык-Куль. Как видно из рисунка 4.6.7, соотношение данных, полученных в результате расчета индекса уязвимости побережья, социально-экономического индекса уязвимости и интегрального индекса уязвимости побережья, может быть использовано в качестве интегральных показателей устойчивого развития прибрежных территорий и как система индикаторов антропогенной трансформации территорий для определения приоритетности мероприятий по устойчивому развитию прибрежных территорий. Джеты-Огузский район (16,12) в категории низкого риска. Ак-Суу (65,0) и Тюп (25,55) характеризуются умеренной степенью уязвимости. Тонский район (86,80) относится к категории высокого риска. Наконец, Иссык-Кульский район (126,33) представляет собой наиболее уязвимый прибрежный участок. Интегрированный индекс уязвимости прибрежной зоны (ICVI), рассчитанный для каждой зоны, показывает, что уязвимость различных участков зависит как от физических, так и от социально-экономических факторов.

Следовательно, оценка уязвимости прибрежной зоны озера Иссык-Куль с использованием интегрированного индекса уязвимости, который учитывает как физические, так и социально-экономические факторы, позволяет детально охарактеризовать экологическое состояние региона. Интегральный индекс уязвимости (ICVI) предоставляет наиболее точную картину уязвимости прибрежных зон. Следовательно, одной из ключевых задач является обеспечение сбалансированного развития природных и социально-экономических систем, находящихся в постоянном взаимодействии, для достижения устойчивого развития природной экосистемы.




Рисунок 4.6.7 Пространственная изменчивость интегрированного индекса уязвимости побережья (ICVI) Иссык-Кульской береговой линии

Таким образом, полученные результаты данных исследований показывают о важности и необходимости внесения изменений в национальную программу

экологического мониторинга оз.Иссык-Куль, включением в ее программу определение показателя хлорофилл-а, а также изменением тактики управления прибрежными экосистемами для по определению неприкасаемых прибрежных буферных зон экосистемы озера для сохранения качества и баланса саморегулирования оз.ИссыкКуль и обеспечения его устойчивого развития. Предложено внести изменения в национальную программу экологического мониторинга, дополнив его показателем “хлорофилл-а”, индексом TLI, организацией наблюдения за трансформирование прибрежной буферной зоны озера; разработаны и внедрены в производство (Департамент биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов экологии и технического надзора КР, Дирекция Биосферной территории “Ысык-Кель”) практические рекомендации “Оптимизация системы экологического мониторинга оз.Иссык-Куль” и методика отбора проб и определения хлорофилла-а.

В ГЛАВЕ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕЦИКЛИНГУ ОТХОДОВ В РЕГИОНАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ приведены методы, подходы и примеры положительных практик рационального использования природных ресурсов в регионах подверженных техногенному воздействию. Главной задачей при организации деятельности промышленных объектов является обеспечение максимальной циркулярности использования как природных ресурсов, так и отходов, возникающих в процессе их работы.

5.1 Экологически безопасные методы восстановления загрязненных нефтепродуктами грунтов. Проведенные исследования и полученные результаты показали, что нефтезагрязненный грунт после биоремедиационных работ можно использовать в качестве покровного материала для полигона, что позволит не только сократить объем отходов на полигоне, но и сэкономить чистый грунт для покрытия. Организация компостирования твердых бытовых отходов (ТБО) также способствует уменьшению объема полигона и позволяет получить качественный мелиорант для засоленных почв.

Представлены методы биоремедиации для восстановления нефтезагрязненных почв, применимых в условиях вечной мерзлоты рудника Кумтор. Результаты физико-химических характеристик почвенного образца до и после обработки представлены в табл. 5.1.1

Исходное содержание подвижного фосфора составляло 6 мг/кг. После рекультивации его содержание увеличилось во всех трех вариантах обработки, причем значительное увеличение ($P < 0,05$) наблюдалось при биоаугментации

до 90 мг/кг. Причина такого увеличения объясняется активностью растворяющих фосфаты бактерий, которые должны были выделять органические кислоты и ферменты фосфатазы, усиливающие растворение нерастворимых соединений фосфора. Содержание обменного калия до начала эксперимента составляло 88 мг/кг, а после биологической обработки оно увеличилось во всех вариантах в среднем на 300 мг/кг. Методы биоремедиации также способствовали увеличению содержания органического углерода в почве, что отражено в таблице 5.1.1. После 90 дней полевых экспериментов исходное содержание их снизилось до 980 мг/кг при обработке с вариантом биостимулирования. Эффект добавления предварительно отобранного консорциума бактерий способствовал деградации нефтепродуктов до 1 300 мг/кг от исходных 2 633 мг/кг. Снижение содержания нефтепродуктов после 90 дней экспериментов составило до 1 340 мг/кг от исходных 2 633 мг/кг при обработке биостимуляцией + биоаугментацией.

Таблица 5.1.1 - Физико-химические характеристики пробы почвы

	рН	Общий азот (%)	Подвиж. форма фосфора	Обмен. калий	Орг.углерод почвы (%)
			(mg/kg)		
Контроль	8.05	0.130	6.0	88.0	2.86
BS	7.5	—	25.6	376.0	6.55
BA	6.5	—	90.0	300.0	6.81
BS + BA	6.0	—	47.2	352.0	7.17

При использовании только BS (биостимуляция) и BA (биоаугментация) через 90 дней процент деградации загрязняющих веществ достиг 62,78% и 50,63%, соответственно (рисунок 5.1.1).




Рисунок 5.1.1 Рисунок 1. Разложение нефтепродуктов после 90 дней опыта, %. BS - биостимуляция; BA – биоаугментация.

При использовании биостимуляции + биоаугментации эффективность разложения составила 49,11 %. Это связано с высокогорными климатическими условиями, т.е. инокулянты, внесенные в новую среду, не смогли быстро адаптироваться и размножиться в сложных климатических условиях. На исходном этапе эксперимента исследована динамика изменения общего количества бактерий в различных опытах биоремедиации почвы в течение 30 дней. Исходное количество бактерий составляло $6,4 \times 10^6$ КОЕ/г, через 14 и 30 дней биостимуляции общее количество бактерий увеличилось до 19×10^6 КОЕ/г и 54×10^6 , соответственно. При биостимуляции также прослеживалась тенденция к увеличению общей численности бактерий, но она оказалась значительно меньше, чем при биостимуляции, составив 26×10^6 КОЕ/г к 30-му дню экспозиции. Однако при комбинированной обработке (BS+BA) общее количество бактерий на 30-й день снизилось до $2,9 \times 10^6$ КОЕ/г с исходных $6,4 \times 10^6$ КОЕ/г (рисунок 5.1.2; 5.1.3).



Рисунок 5.1.2 Процесс микробиологического исследования в лаборатории КТУМ.

Метод биостимуляции или внесение минеральных компонентов в загрязненный грунт, для стимулирования автохтонной микрофлоры ускорила процесс разложения углеводородов: содержание ТРН в почве снизилось на 62,78 % за 90 дней, а общее количество бактерий увеличилось в 8,5 раза. Биоаугментация (добавление предварительно отобранного консорциума бактерий) снизила содержание нефтепродуктов в почве на 50,63 % за 90 дней и вызвала увеличение общего количества бактерий в 4,1 раза. Результаты метода BS + BA оказались менее эффективными по сравнению с биостимуляцией. При обработке BS + BA процент деградации нефтепродуктов составил 49,11% за 90 дней полевых экспериментов. Результаты показали, что биodeградация была ниже при обработке BS + BA по сравнению с биостимуляцией или

биоулучшением в отдельности. Общее количество бактерий при биостимуляции и биоаугментации увеличилось, а при комбинированном методе, напротив, уменьшилось. При использовании комбинированных методов акклиматизация инокулята могла не произойти.

Таким образом, поскольку известно, что и биостимуляция, и биоаугментация повышают эффективность процессов очистки почвы от нефтепродуктов, выбор подходящего метода зависит от условий окружающей среды. Принимая во внимание дорогостоящие методы обогащения разлагаемых растений и их инокуляции, мы считаем, что использование биостимуляции в таких сложных климатических условиях является наиболее целесообразным.




Рисунок 5.1.3. Изменение общего количества бактерий в загрязненной почве при проведении биоремедиации

Проведенные исследования продемонстрировали возможность использования методов биологической обработки почвы в климатически холодных условиях высокогорья. Во всех вариантах биоремедиационных обработок наблюдалось снижение содержания нефтепродуктов в почве. Наилучший результат по снижению содержания нефтепродуктов в почве показал метод биостимуляции. На 5.1.4 приводятся ход полевых исследований на руднике “Кумтор”.



Рисунок 5.1.4 Ход реализации полевых экспериментов, 2019г.

Проведенные исследования продемонстрировали возможность использования методов биологической обработки почвы в климатически холодных условиях высокогорья. Во всех вариантах биоремедиационных обработок наблюдалось снижение содержания нефтепродуктов в почве. Наилучший результат по снижению содержания нефтепродуктов в почве показал метод биостимуляции. Очищенный материал может быть приравнен к категории инертных промышленных отходов, относящихся к IV классу опасности. С площадки рекультивации он может быть использован при послойной засыпке в качестве изолирующего и рекультивационного слоя полигона рудника.

5.2 Возможности использования высокогорных растений для фиторемедиации нефтезагрязненных грунтов. Использование метода фиторемедиации на завершающем этапе очистки грунтов загрязненных нефтепродуктами в условиях высокогорья на высоте более 3500 м.н.у.м. актуально как с экологической, так и с экономической точек зрения. Установлено в целом фитотоксическое действие нефтяного загрязнения почв на рост и произрастание растений. Однако, на 20-е сутки произрастания отмечался стимулирующий эффект нефтяного загрязнения на рост корня и стебля растений, но на 40-е сутки оно все же оказывало угнетающее действие, в то время как фоновые образцы продолжали расти. Несмотря на выраженное фитотоксическое действие токсиканта, высокогорные растения, такие как овсяница валлиская (*Festuca valesiaca* Gaudin) и плевел многолетний (*Lolium perenne*) проявляли способность произрастать на загрязненном нефтепродуктами грунте, что важно для улучшения газовой воздушной среды нефтезагрязненного грунта и улучшения его самоочищающей способности. Таким образом, метод фиторемедиации с использованием плевела многолетнего (*Lolium perenne*) и овсяницы валлисской (*Festuca valesiaca* Gaudin), типичных представителей высокогорья, способных произрастать на

высоте 3000-4200 м.н.у.м и проявившие устойчивость произрастать при определенном уровне нефтяного загрязнения могут быть использованы для реабилитации нефтезагрязненных грунтов на завершающем этапе их очистки и требует продолжения исследований по изучению изменения физиологических свойств этих высокогорных растений.

Также была проведена оценка улучшения агрохимических показателей слабозасоленных почв по развитию тест-растений методом экспрессного фитотестирования. В качестве почвоулучшителя использовали компост, полученный из твердых бытовых отходов (ТБО), который был инициирован и реализован проектом “Үч чака”, в ходе работы которого был организован сбор и компостирование ТБО. За 6 месяцев проведенного эксперимента было накоплено 2430,8 кг пищевых отходов и получено 200 кг биокомпоста, было подсчитано, что из 12 кг пищевых отходов можно получить 1 кг чистого биокомпоста. Следовательно, организовав сбор органических пищевых отходов до попадания их в мусорный полигон можно уменьшить объем выбрасываемых пищевых отходов в полигон ТБО города Бишкек и получать ценный биокомпост.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Установлена необходимость смены парадигмы ПДК и дополнение системы экологического мониторинга водных и почвенных экосистем более информативными, интегрированными, комплексными методами и индикаторами. Используемые, в данном исследовании такие индексы как: коэффициент обогащения (**EF**), индекс геоаккумуляции (**I_{geo}**), коэффициент загрязнения (**CF**), степень загрязнения (**Cd**), индекс потенциального экологического риска (**PER**) и индекс экологического риска (**RI**), позволяют определить уровень загрязнения почв тяжелыми металлами, и определяют стратегию устойчивого развития и охраны окружающей среды.
2. Определено, что наиболее толерантными к загрязнению почвы нефтепродуктами оказались такие культуры как кукуруза сахарная (*Zéa máys*), овес обыкновенный (*Avéna satíva* L.), горох посевной (*Lathyrus oleraceus*) и эспарцет виколистный (*Onobrychis viciifolia*). Их всхожесть составила 88,3%, 85%, 67,86%, 55% соответственно. Это свидетельствует о том, что указанные виды могут быть использованы в фитоиндикации нефтезагрязненных почв и фиторекультивации супесчаной почвы при условии умеренного загрязнения нефтепродуктами.
3. Выявлено, что фитоиндикационные показатели облепихи крушиновидной (*Hipporphae rhamnoides* L.), основанные на морфологических изменениях, а также на росте и развитии растения, могут быть использованы в качестве оперативных индикаторов степени нагрузки прибрежных экосистем.

4. Установлена необходимость изменения в национальную программу экологического мониторинга озера Иссык-Куль, включая в ее состав определение показателя “*хлорофилл-а*” и индекса *TLI*.
5. Созданы интегрированные эколого-экономические показатели для оценочно-картографических моделей территорий, подвергающихся высокой антропогенной нагрузке. Установлена значимость проведения оценки уязвимости прибрежных экосистем с учетом специфических природно-климатических и социально-экономических условий целевой территории. Используемый в исследовании *интегральный индекс уязвимости (ICVI)* позволяет учесть пространственную взаимосвязь между параметрами социально-экономического развития территории и экологическим потенциалом.
6. Разработана и внедрена современная модель экологического мониторинга экосистемы озера Иссык-Куль позволяющая оценивать степень загрязнения, своевременно выявлять угрозы и разрабатывать стратегии по предотвращению и минимизации негативного воздействия на экосистему озера, которая применяется региональным органом управления в сфере охраны окружающей среды;
7. Предложена технология ремедиации грунтов, загрязненных нефтепродуктами, для условий высокогорья и холодных климатических зон рудника Кумтор. Установлено, что метод биостимулирования является эффективным и целесообразным.
8. Установлено, что метод фиторемедиации с использованием плевела многолетнего (*Lolium perenne*) и овсяницы валлисской (*Festuca valesiaca* Gaudin), типичных представителей высокогорья, способных произрастать на высоте 3000-4200 м.н.у.м и проявляющих устойчивость к определенному уровню нефтяного загрязнения, эффективен для реабилитации нефтезагрязненных грунтов на завершающем этапе их очистки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендовано использовать *коэффициент обогащения (EF)*, *индекс геоаккумуляции (Igeo)*, *коэффициент загрязнения (CF)*, *степень загрязнения (Cd)*, *индекс потенциального экологического риска (PER)* и *индекс экологического риска (RI)* для определения уровня загрязнения почв тяжелыми металлами.
2. Рекомендовано использовать морфологические изменения облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides* L.) в качестве оперативных индикаторов степени нагрузки прибрежных экосистем.

3. Рекомендовано внести изменения в национальную систему экологического мониторинга озера Иссык-Куль, включением в его программу параметра "хлорофилл-а" и TLI индекса (акты внедрения от 13.08.2024; 20.08.2024г.).
4. Рекомендовано использовать интегральный индекс уязвимости (ICVI), для комплексной оценки влияния как социально-экономического развития территории, так и экологического потенциала экосистемы, что является ключевым для достижения долгосрочного устойчивого развития.
5. Разработаны рекомендации и руководство по рекультивации нефтезагрязненного грунта полигона опасных отходов ЗАО "Кумтор" Голд Компани. Рекомендуется использовать очищенный грунт при послойной засыпке в качестве изолирующего и рекультивационного слоя полигона рудника (акт выполненных работ от 24.12.2019, С-6123 от 13.11.2018).
6. Рекомендовано использовать метод биостимулирования, при ремедиации нефтезагрязненных почв как наиболее эффективного и целесообразного в условиях высокогорья и холодных климатических зон рудника Кумтор.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. **Totubaeva, N. E.** An integrated coastal vulnerability index for sustainable development of coastal ecosystems: a case study of Issyk-Kul lake [Text] / Totubaeva, N. Tokpaeva, Z. Izakov J. Abdykadyrova, R.// *Scientia Iranica*. - 2024. - (online publication).- [Electronic resource]. - Available at: URL: https://scientiairanica.sharif.edu/article_23698_5b2c5784ca978590c0fbee71186a3376.pdf
2. **Totubaeva, N. E.** Bioremediation approaches for oil contaminated soils in extremely high-mountainous conditions [Text] /Totubaeva, N. Tokpaeva, Z. Izakov, J. Moldobaev, M.// *Plant Soil Environ*. - 2023. - V. 69, № 4. - P. 188-193. [Electronic resource].-Available at: URL:<https://pse.agriculturejournals.cz/pdfs/pse/2023/04/06.pdf>
3. **Totubaeva, N. E.** Comparison of the Machigin and CAL Methods for Extraction of Plant Available P in Soils [Text] / Buczko, U. Totubaeva, N. Kuchenbuch, R. O. // *Communications in Soil Science and Plant Analysis*. - 2024. - V. 55, № 15. - P.2217-2231. [Electronic resource]. - Available at URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2024.2345149>
4. **Totubaeva, N. E.** Ecological Assessment of Technogenically Disturbed Soils of the Mountain Ecosystems of Kyrgyz Republic based on the TRIAD method [Text] / Totubaeva, N. Tokpaeva, Z. Kojobaev, K. Usubalieva, A. Terekhova,V.// *Polish Journal of Environmental Studies*. – 2022. – № 31(3). – P. 2256-2272. [Electronic resource]. – Available at URL: <https://www.pjoes.com/pdf-143509-74305?filename=Ecological%20Assessment%20of.pdf>
5. **Totubaeva, N. E.** Comparison of Various Ecological Indexes for Environmental Assessment of Vulnerable Mountain Ecosystems [Text] / Totubaeva,

N. Tokpaeva, Z. Kojobaev, K. Kurmanbekova, G.// *Polish Journal of Environmental Studies*. - 2020. - № 29(4). - P. 2879-2887. [Electronic resource]. – Available at URL: <https://www.pjoes.com/A-Comparison-of-Various-Ecological-Indexes-nfor-Environmental-Assessment-of-Vulnerable,109721,0,2.html>.

6. **Totubaeva, N. E.** Microbiological Diversity and Biotechnological Potential of the Soil Ecosystem of the High Mountainous Landfill [Text]/Totubaeva, N. Tokpaeva, Z. Akjigit uulu, A. Kojobaev, K.//*Polish Journal of Environmental Studies*. -2019. -№ 28(6). -P. 4429-4435. [Electronic resource]. – Available at URL: <https://www.pjoes.com/pdf-99904-42208?filename=Microbiological%20Diversity.pdf>

7. **Totubaeva, N. E.** Dynamics of microbiological diversity of soils in the Chu valley with changes in the type of pasture use [Text] / Totubaeva, N. Shalpykov, K. // *Arid Ecosystems*. – 2022. – № 2. – P. 187-192.[Electronic resource]. – Available at URL: <https://link.springer.com/article/10.1134/S2079096122020135>

8. **Totubaeva, N. E.** Potential of Sea Buckthorn (*Hippophae rhamnoides* L.) Thickets in Preserving Endangered Ecosystems in Kyrgyz Republic [Text]/ Totubaeva, N. Usubalieva, A. Abdykadyrova, R.// *Grassroots Journal of Natural Resources*. – 2024. – V. 7, № 2. – P. 96-118.[Electronic resource]. – Available at URL: <https://grassrootsjournals.org/gjnr/0702m00400.html>.

9. **Totubaeva, N. E.** Ecological aspects in the use of soil enzymes as indicators of anthropogenic soil pollution [Text] / Totubaeva, N. Batykova, A. Karches, T. Osmonaliev, A. Sultanalieva, V.// *Scientific Horizons*. – 2023. – № 26. – P. 88-98. [Electronic resource]. – Available at URL: https://sciencehorizon.com.ua/web/uploads/pdf/Scientific%20Horizons_2023_Vol.%2026,%20No.12-88-98.pdf

10. **Тотубаева, Н. Э.** Влияние разработки Кара-Кечинского бурогоугольного месторождения на состав и свойства вод реки Кара-Кече [Текст]/ Кожобаев, К. Тотубаева, Н. Э. Шайкиева, Н. Оторова, С. // *Горный журнал*. – 2022. – № 12. - P. 68-72. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://www.rudmet.ru/journal/2165/article/36005/>

11. **Тотубаева, Н.Э.** Геоэкологические проблемы, связанные с деятельностью горнодобывающих предприятий Кыргызской Республики [Текст] / Кожобаев, К. Молдогазиева, Г. Тотубаева, Н. Оторова, С.// *Горный журнал*. – 2016. – № 8. – С. 32-37. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://www.rudmet.ru/journal/1539/article/26411/>.

12. **Totubaeva, N. E.** Challenges of Transforming Coastal Buffer Zones into Urban Systems and their Sustainable Development Management: Case of Lake Issyk-Kul [Text] / Abdyralieva, A. Totubaeva, N.E.// *Grassroots Journal of Natural Resources*. – 2024. – V. 7, № 2. – P. 160-178. [Electronic resource]. – Available at URL: <https://grassrootsjournals.org/gjnr/nr.07-02-08.abdyralieva-totubaeva.pdf>.

13. **Тотубаева, Н. Э.** Влияние антропогенных факторов побережья озера Иссык-Куль на состояние облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides*) [Текст] / Тотубаева, Н. Э. Эсиркепова М, Кожобаев К.// *Успехи современного естествознания*. - 2021. - № 5. - С. 110-116. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://natural-sciences.ru/article/view?id=37631>

14. **Тотубаева, Н. Э.** Водный режим зарослей облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides*) побережья озера Иссык-Куль [Text] / Тотубаева, Н. Дуйшебекова С., Кожобаев К.// *Успехи современного естествознания*. - 2021. – № 5. – Р. 77-83. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://natural-sciences.ru/article/view?id=37611>

15. **Тотубаева, Н. Э.** Анализ изменения земельного фонда Чуйской области с использованием ГИС-технологий [Текст] / Тотубаева, Н. Максатбекова, А. // *Успехи современного естествознания*. – 2022. – № 6. – С. 96-102.[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37847>

16. **Тотубаева, Н. Э.** Влияние города Нарын на некоторые показатели вод реки Нарын [Текст] / Оторова, С. Тотубаева, Н. Асанов, Б. Кожобаев, К.// *Экология урбанизированных территорий*. – 2021. – № 2. – С. 33-39. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=sioobj&ysclid=m6s3f3bhia405846389>

17. **Тотубаева, Н. Э.** Возможности использования высокогорных растений для фиторемедиации нефтезагрязненных грунтов [Текст] / Тотубаева, Н. Жумабаева М., Кожобаев К.// *Успехи современного естествознания*. - 2020. - Т. 25, № 5. - С. 96-100. [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://natural-sciences.ru/article/view?id=37398>

18. **Тотубаева, Н. Э.** Фитотестирование нефтезагрязненных почв с помощью фитотолерантных растений [Текст] / Кожобаев, К., Токпаева, Ж., Эсенжанова, Г., Тотубаева, Н. // *Проблемы региональной экологии*. – 2019. – №2. – С. 20-25. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://eco-rei.ru/ru/archive/2019/2>

19. **Тотубаева, Н. Э.** Изменения некоторых показателей почв и грунтов города Балыкчы, загрязненных нефтепродуктами после ремедиации [Текст] / Тотубаева, Н., Токпаева, Ж., Талайбекова, Г., Кожобаев, К. // *Проблемы региональной экологии*. – 2019. – №2. – С. 38-43. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://ecoregion.ru/annot/pre-N2-2019.pdf>

20. **Тотубаева, Н. Э.** Оценка экологического состояния воды озера Иссык-Куль по индексу трофического состояния (TSI) [Текст] / Тотубаева, Н. // *Известия Национальной Академии наук КР*. – 2023. – №7. – С. 185-194. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://ilim.naskr.kg/index.php/main/article/view/544/432>

21. **Тотубаева, Н.Э.** Фитотестирование почв, загрязненных нефтепродуктами, в условиях длительного загрязнения: на примере города Балыкчы [Текст] / Тотубаева, Н. //Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. – 2023. – №7. – С. 152-156. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://ilim.naskr.kg/index.php/main/article/view/520/410>

22. **Тотубаева, Н.Э.** Комплексное использование прибрежных экосистем озера Иссык-Куль – основа устойчивого развития [Текст] // Исследование живой природы Кыргызстана. – 2021. – №1. – С. 72-76. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47311235>

23. **Тотубаева, Н.Э.** Подбор оптимальной питательной среды для культивирования углеводородокисляющих бактерий [Текст] / Токпаева, Ж. // Наука, Новые технологии и Инновации Кыргызстана. – 2019. – №12. – С. 39-42. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43930789>

24. **Тотубаева, Н. Э.** Оценка возможности переработки твердых бытовых отходов с получением биокомпоста [Текст] / Тотубаева, Н. Маймеков, З. // Наука, Новые технологии и Инновации Кыргызстана. – 2019. – №11. – С. 55-61. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://science-journal.kg/ru/journal/1/archive/12513>

25. **Тотубаева, Н. Э.** О некоторых физико-химических показателях грунтовых вод села Ат-Башы [Текст] / Оторова, С. Тотубаева, Н. Молдогазиева, Г., Касиев, А. // Наука, Новые технологии и Инновации Кыргызстана. – 2019. – №4. – С. 223-227. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://science-journal.kg/ru/journal/1/archive/12378>

26. **Тотубаева, Н. Э.** Микробиологическое разнообразие почвы полигона опасных отходов рудника Кумтор [Текст] / Акжигит уулу, А. Тотубаева, Н.// Наука, Новые технологии и Инновации Кыргызстана. – 2018. – №1. – С. 31-34. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://science-journal.kg/media/Papers/nntiik/2018/1/nntiik_2018-1-31-34.pdf

27. **Тотубаева, Н.Э.** Анализ состояния озера Иссык-Куль по гидрохимическим показателям [Текст] / Тотубаева, Н. Молдогазиева, Г. Кожобаев, К.// Наука и Новые технологии и Инновации Кыргызстана. – 2017. – №3. - С. 108-112. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://drive.google.com/file/d/1N8Ng2THG3Lv6TujEfE0yzxRAhAwNfwRK/view?usp=sharing>

28. **Тотубаева, Н. Э.** Экогеохимический мониторинг вод озера Иссык-Куль за 2016-2018 гг. [Текст] / Тотубаева, Н. Кожобаев, К.//Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. – 2024. – №5. – С. 48-58. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:

<https://drive.google.com/file/d/1fLThXUtz9dX5lICJ2RfF4-gsUpi9Bodl/view?usp=sharing>

29. **Totubaeva, N. E.** Some indicators of the ecological state of a deep-water lake intensively used for recreational purposes – a case study of Issyk-Kul Lake, Kyrgyz Republic [Текст] / Totubaeva, N. Kojobaev, K. // Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. – 2024. – №5. – С. 122-134. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://drive.google.com/file/d/1ZPZLDnLL4UcMnp36sda0fkOKyBB0FBty/view?usp=sharing>

30. **Totubaeva, N. E.** Changes in agrochemical indicators of soils under the rotational technique of pasture use in the conditions of the Kyrgyz Republic [Текст] / Totubaeva, N. E. Shalpykov, K. // International Conferences on Science and Technology; Engineering Science and Technology (ICONST–EST–2021), Budva, Montenegro, September 8-10, 2021, p. 132. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://drive.google.com/file/d/1RlS7t4z5-kJ_PYLZc5Mx-pPn5ELFzeaq/view?usp=sharing

Тотубаева Нурзат Эрмековнанын “Кыргызстандын түндүгүнүн туруктуу өнүгүүсүнүн суу жана топурак факторлору” темасындагы 02.03.08 – экология адистиги боюнча биология илимдеринин доктору илимий даражасын алуу үчүн сунушталган диссертациясынын РЕЗЮМЕСИ

Ачкыч сөздөр: экосистеманын экологиялык абалынын критерийлери, туруктуу өнүгүү, экологиялык индекстер, өндүрүш калдыктарын кайра иштетүү, биоремедиация.

Изилдөө объектилери: мунай зат, оор металлдар менен кирдеген топурактар, Ысык-Көлдүн экосистемасы.

Изилдөө предмети: экологиялык индекстердин жана көрсөткүчтөрдүн негизинде жаратылыш жана техногендик объекттердин суу жана топурак ресурстары.

Изилдөөнүн максаты: Кыргызстандын түндүгүндөгү өнөр жай жана урбанизацияланган аймактарда топурак жана суу экосистемаларынын экологиялык абалын баалоо критерийлерин жана комплекстүү методологиясын, ошондой эле калдыктарды рекультивациялоонун жана кайра иштетүүнүн экологиялык жактан туруктуу технологияларын иштеп чыгуу.

Изилдөө ыкмалары: суу жана топурак ресурстарынын абалын баалоонун комплекстүү ыкмалары, булганган кыртыштарды биоремедиациялоо ыкмалары, тазаланган кыртыштарды кайра иштетүү ыкмалары жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу ыкмалары.

Илимий жаңылыгы: Ысык-Көл облусунун урбанизацияланган жана техногендик зоналардын топурак экосистемаларынын экологиялык абалына байытуу коэффициентинин (EF), геоаккумуляциялык индексинин (Igeo), булгануу факторунун (CF), булгануу даражасынын (Cd), потенциалдык экологиялык тобокелдик индексинин (PER) жана экологиялык тобокелдиктин (RI) индекстерин колдонуу менен баа берүү жүргүзүлгөн; Балыкчы шаарынын мунай зат менен булганган топурактардын абалын баалоо үчүн фитотестирлөө ыкмалары иштелип чыгып сунушталган; Ысык-Көлдүн жээктик экосистемасынын рекреациялык жүктөмүн баалоодо чычырканактын (*Hippophae rhamnoides* L.) фитоиндикациялык параметрлери изилденген; Ысык-Көлдүн экосистемасынын булгануу даражасын баалоого мүмкүндүк берүүчү экологиялык мониторингинин заманбап модели иштелип чыккан; мунай менен булганган кыртыштарды рекультивациялоонун экологиялык жактан туруктуу технологиялары иштелип чыккан; Кумтөр кенинин бийик тоолуу аймактарынын шарттарында мунай менен булганган кыртыштарды рекультивациялоонун жана технологиянын акыркы этабында бийик тоолуу өсүмдүктөрдүн жергиликтүү түрлөрүн колдонуунун жолдору иштелип чыккан жана негизделген.

Колдонуу тармагы: экология жана айлана-чөйрөнү коргоо

РЕЗЮМЕ

докторской диссертации Тотубаевой Нурзат Эрмековны на тему: “Водные и почвенные факторы устойчивого развития севера Кыргызстана”, представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.08 – экология

Ключевые слова: критерии экологического состояния экосистем, устойчивое развитие, экологические индексы, рециклинг промышленных отходов, биоремедиация.

Объекты исследования: почвы загрязненные нефтепродуктами, тяжелыми металлами, экосистема озера Иссык-Куль.

Предмет исследования: водные и почвенные ресурсы, исследуемых природных и техногенных объектов, основанных на экологических индексах и индикаторах.

Цель исследования: Разработка критериев и интегрированной методологии для оценки экологического состояния почвенных и водных экосистем в промышленных и урбанизированных районах севера Кыргызстана, а также экологически устойчивых технологий ремедиации и переработки отходов.

Методы исследования: интегральные методы оценки состояния водных и почвенных ресурсов, методики биоремедиации загрязненных почв, методы

рециркуляции очищенных грунтов и методы рационального использования природных ресурсов.

Научная новизна: проведена оценка экологического состояния урбанизированных и техногенных зон, с использованием индексов коэффициент обогатения (EF), индекс геоаккумуляции (Igeo), коэффициент загрязнения (CF), степень загрязнения (Cd), индекс потенциального экологического риска (PER) и индекс экологического риска (RI) в почвах Прииссыкуля; разработаны и рекомендованы методы фитотестирования для оценки состояния почв, загрязнённых нефтепродуктами, супесчаных почв в г. Балыкчи; изучены фитоиндикационные параметры облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides* L.), в контексте оценки рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы озера Иссык-Куль; разработана современная модель экологического мониторинга экосистемы озера Иссык-Куль позволяющая оценивать степень загрязнения озера; разработаны экологически устойчивые технологии ремедиации нефтезагрязнённых почв; в условиях высокогорных территорий рудника Кумтор, разработаны и обоснованы подходы к применению местных видов высокогорных растений на завершающей стадии ремедиации и рекультивации нефтезагрязнённых почв.

Область применения: экология и защита окружающей среды

SUMMARY

of the dissertation of Nurzat Ermekovna Totubaeva on the “Water and soil factors of sustainable development of the north of Kyrgyzstan” for the degree of Doctor of Biological Sciences on specialty 03.02.08 - ecology.

Keywords: criteria of ecological state of ecosystems, sustainable development, ecological indices, industrial waste recycling, bioremediation.

Research objects: soils polluted with oil products, heavy metals, ecosystem of Issyk-Kul Lake.

The subject of the study: water and soil resources of the studied natural and anthropogenic objects based on environmental indices and indicators.

Purpose: Development of criteria and integrated methodology for assessing the ecological state of soil and aquatic ecosystems in industrial and urbanized areas of northern Kyrgyzstan, as well as environmentally sustainable technologies for remediation and waste treatment.

Research methods: integral methods of assessing the state of water and soil resources, methods of bioremediation of contaminated soils, methods of recycling of treated soils and methods of rational use of natural resources.

Results and novelty: assessment of ecological state of urbanized and technogenic zones was carried out, using indices of enrichment factor (**EF**), geoaccumulation index (**I_{geo}**), pollution factor (**CF**), pollution degree (**C_d**), potential ecological risk index (**PER**) and ecological risk index (**RI**) in soils of Issyk-Kul district; phytotesting methods were developed and recommended to assess the state of soils contaminated with oil products, sandy loam soils in the city of Balykchy; phytoindication parameters of sea buckthorn (*Hippophae rhamnoides* L.) were studied in the context of recreation assessment), in the context of assessing the recreational load on the coastal ecosystems of Lake Issyk-Kul; developed a modern model of ecological monitoring of the ecosystem of Lake Issyk-Kul allowing to assess the degree of pollution of the lake; developed environmentally sustainable technologies for remediation of oil-contaminated soils; in the conditions of high-mountainous areas of the Kumtor mine, developed and substantiated approaches to the use of native species of high-mountainous plants at the final stage of remediation and reclamation of oil-contaminated soils.

Field of application: ecology and environmental protection